



Imprimeries réunies, A, rue Mignon, 2, Paris.

ANNALES  
DES  
SCIENCES NATURELLES

ZOOLOGIE

ET  
PALÉONTOLOGIE

COMPRENANT  
L'ANATOMIE, LA PHYSIOLOGIE, LA CLASSIFICATION  
ET L'HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX

PUBLIÉES SOUS LA DIRECTION DE  
MM. H. ET ALPH. MILNE EDWARDS

TOME XVI



PARIS  
G. MASSON, ÉDITEUR  
LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
Boulevard Saint-Germain et rue de l'Éperon  
En face de l'École de médecine

1883

DESCRIPTION  
D'ESPÈCES NOUVELLES D'OISEAUX

PROVENANT DES ILES DU CAP-VERT

Par M. E. OUSTALET.

Dans les collections recueillies par l'expédition récente du *Talisman* se trouvaient un Puffin et un Moineau qui me paraissent appartenir l'un à une espèce bien distincte, l'autre à une race encore non décrite. Ces deux oiseaux ont été capturés avec un petit Thalassidrome en duvet, qui est *peut-être* un *Thalassidroma pelagica*, dans l'archipel des îles du Cap-Vert, sur l'îlot Branco ou Branca, où se trouvent également ces reptiles étranges encore si rares dans les collections et désignés par les naturalistes sous le nom de *Macroscincus Coctei*.

Le Puffin est parfaitement adulte et, par sa taille plus faible et son bec moins robuste, se distingue facilement du *Puffinus cinereus*, au groupe duquel il appartient, quoique, à certains égards, il rappelle aussi une espèce des Moluques, de la Nouvelle-Guinée et du Japon, le *Puffinus leucomelas* (Tem.), qui a cependant la tête beaucoup plus claire et les pattes jaunes. Voici, du reste, la description du Puffin de Branco que je crois devoir signaler à l'attention des ornithologistes :

1. *Puffinus Edwardsii*, n. sp., P. Puffino cinereo minor, P. Baroli major, capite, dorso et tectricibus alarum ex griseo infuscatis; plumis dorsi fulvo lavatis et pallidis marginibus ornatis; tergo canescente; caudâ vix cuneata nigricante; gula, pectore medio et abdomine candidis; pectoris lateribus fuscis; hypochondriis nigricantibus; rostro gracili obscuro, mandibula basin versus rubescente, unco flavescente; pedibus roseis.

Parties supérieures d'un gris brunâtre passant au brun fauve sur le dos, dont les plumes ont des lisérés clairs, et au brun noirâtre sur les ailes, dont les rémiges tirent au noir tandis que les plumes secondaires sont en partie blanches; queue légèrement cunéiforme, d'un gris noirâtre foncé; gorge, milieu de la poitrine et de l'abdomen d'un blanc pur; côtés de la poitrine roussâtres; plumes situées en arrière des pattes d'un gris noirâtre; sous-caudales blanches avec quelques taches brunâtres; bec assez grêle, d'un ton brun verdâtre avec

la pointe jaune et la base de la mandibule inférieure rougeâtre; pattes d'un rose chair, ongles jaunes.

Longueur totale, 0<sup>m</sup>,440 environ; longueur de l'aile, 0<sup>m</sup>,320; longueur de la queue, 0<sup>m</sup>,150; longueur du bec (*culmen*), 0<sup>m</sup>,050; hauteur du bec à la base, 0<sup>m</sup>,012; au milieu, 0<sup>m</sup>,010; longueur du tarse, 0<sup>m</sup>,043; longueur du doigt médian, 0<sup>m</sup>,053 (sans l'ongle).

Le Moineau offre une livrée analogue à celle de la femelle du *Passer jagoensis* (Gould), avec des teintes plus grises et des sourcils blancs bien marqués; il peut être caractérisé de la manière suivante :

2. *Passer brancoensis*, n. sp., P. passero jagoense minor, capite fusco-nigricante; dorso fulvo, nigro distincte strato, tectricibus alarum infuscatis nigro et albo signatis; alis caudaque ex grino nigricantibus, marginibus pallidis limbatis; superciliis latis albis; auribus infra argenteis, supra nigricantibus; gula pectore et abdomine albidis; rostro fusco, mandibula flavescente; pedibus infuscatis.

Parties supérieures d'un gris brunâtre tirant au noirâtre sur la tête, et d'un ton plus clair sur le dos, où l'on remarque de larges stries noirâtres; rémiges et rectrices d'un gris noirâtre avec des lisérés clairs; couvertures des ailes brunes avec des taches blanches et noires formant une double bande transversale; parties inférieures du corps d'un blanc légèrement teinté de jaune; bec brun avec la base de la mandibule inférieure plus claire; pattes d'un brun foncé.

Longueur totale, 0<sup>m</sup>,415; longueur de l'aile, 0<sup>m</sup>,059; longueur de la queue, 0<sup>m</sup>,052; longueur du bec (*culmen*), 0<sup>m</sup>,010; longueur du tarse, 0<sup>m</sup>,019.

L'individu décrit ci-dessus paraît être une femelle, et le mâle a probablement le dos fortement nuancé de roux comme le mâle du *Passer jagoensis*, ou Moineau de l'île San-Jago.